

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente confirma la presencia de mejillón cebra en el embalse de Iznájar



09-08-2012

Noticias

En 2010 se puso en marcha un expediente para el control de esta especie invasora en los pantanos de la Cuenca del Guadalquivir

La [Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente](#) [1] ha confirmado la presencia de mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*) en el embalse de Iznájar (Córdoba), perteneciente a la Cuenca del Guadalquivir, y sus alrededores. Tras una visita rutinaria a la zona, los agentes ambientales encontraron once ejemplares vivos adosados a las ramas muertas de la vegetación de la orilla, y que, debido al continuo descenso del nivel de las aguas que se viene produciendo por las escasas precipitaciones, habían quedado emergidos y localizables a simple vista.

Ante esta situación, deben aplicarse de forma inmediata todos los protocolos preventivos de dispersión de esta especie a cauces no afectados. En el año 2010, la [Junta de Andalucía](#) [2] puso en marcha un expediente para el control del mejillón cebra en los embalses de la administración andaluza por un total de 956.055 euros y con vigencia hasta 2013. Desde 2010 hasta septiembre de 2011 se llevaron a cabo trabajos de detección y seguimiento que dieron como conclusión que la presencia y reproducción de dicha especie estaba circunscrita al embalse y contraembalse de los Bermejales, en la provincia de Granada, y cuenca del Guadalquivir.

Por ello, se adoptaron las medidas necesarias para evitar la propagación del molusco a otras zonas y embalses tanto de la cuenca del Guadalquivir como de otras de la comunidad autónoma, entre ellas las de desinfección para la navegación en dicho embalse de los Bermejales. En octubre de 2011, el expediente de prevención y lucha contra el mejillón cebra fue traspasado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en ejecución de sentencia, dejando dicho organismo en suspenso el mismo con el consiguiente riesgo de propagación del mejillón a otras zonas, como parece ser que ha ocurrido tras detectarse en el pantano de Iznájar, perteneciente a la Cuenca del Guadalquivir.

El mejillón cebra

El mejillón cebra (*Dreissena polymorpha*) es un molusco de agua dulce procedente del mar caspio que fue detectado por primera vez en 2001 en Cataluña en aguas del bajo Ebro habiéndose extendido al menos por nueve comunidades autónomas principalmente del centro y levante y por las cuencas del Ebro, Júcar, Cantábrico y Guadalquivir.

Esta especie está catalogada como una de las exóticas invasoras más dañinas del mundo, causando graves pérdidas económicas y alterando el hábitat de las especies autóctonas con las que compete por el alimento. Entre los vectores de dispersión de esta especie invasora se encuentra la navegación recreativa, la pesca deportiva desde embarcación, los trasvases de agua a pequeña y gran escala y cualquier actividad que implique movimiento de aguas de una masa a otra.

Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente

Enlaces:

[1] <http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaymedioambiente>

[2] <http://www.juntadeandalucia.es/>

